TESTUDO ACTINODES, *Bell.*

Testâ oblongo-ovatâ, elongatâ; scutis elevatis, sulcatis, nigris, luteo radiatis; scuto nuchali nullo.

Sebæ Thes. I. t. lxxx. fig. 3.
Testudo geometrica. Lacép. Quad. Ovip. I. p. 155. t. ix.
T. geometrica, var. Daud. Rept. II. p. 265.
T. actinodes. Bell, Zool. Journ. III. p. 419. tab. supp. xxiii.
Junior. *T. elegans.* Schœpff, Hist. Test. t. xxv. p. 111.—Daud. Rept. II. t. xxv. fig. 2. p. 266.
T. stellata. Schweig. Prod. sp. 13?—Gray, Syn. p. 12. t. iii.

Habitat in Indiâ orientali,—in insulâ Madagascar, &c.
Mus. nostr.

Descriptio. *Caput* obtusum, fusco et flavo variegatum, scutatum. *Mandibulæ* denticulatæ. *Oculi* fusci. *Collum* fuscum, squamis minutis tectum. *Pedes* fusci; *anteriores* squamis numerosis, magnis, imbricatis, lanceolatis, luteis, anticè defensi; *posteriores* squamis parvis, rotundatis, gibbosis, tecti. *Femora* utrinque squamis tribus vel quatuor magnis, conicis, luteo-fuscis. *Cauda* mediocris, squamata. *Testa* oblongo-ovata, elevata, margine anticè emarginato, posticè dentato. *Scuta dorsalia* concentricè sulcata, convexa, nigra, radiis luteis, marginem versus latioribus, areolis magnis, elevatiusculis; *vertebralia* elevata, subconica, truncata; primum pentagonum; secundum hexagonum, anticè angustius; tertium transversè hexagonum; quartum hexagonum, posticè angustatum; quintum subhexagonum, anticè angustius, posticè expansum, margine rotundato: *costalia* gibbosa, areolis prope marginem superiorem positis, planis, vel paululò elevatis; primum trapezoideum; secundum et tertium elongato-pentagona; quartum subquadratum: *marginalia* anteriora porrecta, angulata, emarginationem triangularem formantia; secundum et tertium declivia; lateralia verticalia, margine plano, integro; paria tria posteriora prominentia, angulata. *Scutum nuchale* nullum: *caudale* magnum, latum, pentagonum, perpendiculare vel